

非免疫规划疫苗公示

疫苗名称	预防疾病	免疫程序	接种方法、剂量	禁忌症	不良反应及注意事项	疫苗价格	预防接种服务费
四价人乳头瘤病毒(HPV)疫苗	预防HPV6/11/16/18型病毒感染引起的宫颈癌及其癌前病变	推荐于0、2和6月分别接种1剂次，共接种3剂，每剂0.5mL	上臂外侧三角肌肌内注射	1. 对疫苗的活性成份或任何辅料成份有过敏反应者禁用。2. 注射本品后有过敏反应症状者，不应再次接种本品。	不良反应:全身不良反应包括头痛、发热等，局部不良反应包括红斑、疼痛、肿胀等，以上不良反应程序度为轻至中度，且短期内可自行缓解。	808元/支	22元/支
九价人乳头瘤病毒(HPV)疫苗	预防HPV6、11、16、18、31、33、45、52、58九种病毒感染引起的宫颈癌及其癌前病变。	推荐于0、2和6月分别接种1剂次，共接种3剂，每剂0.5mL	上臂外侧三角肌肌内注射	1. 对疫苗的活性成份或任何辅料成份有过敏反应者禁用。2. 注射本品后有过敏反应症状者，不应再次接种本品。	不良反应:全身不良反应包括头痛、发热等，局部不良反应包括红斑、疼痛、肿胀等，以上不良反应程序度为轻至中度，且短期内可自行缓解。	1308元/支	22元/支
破伤风疫苗	用于预防破伤风。	视受种者年龄及百白破疫苗接种情况定	上臂三角肌肌内注射。每1次人用剂量0.5ml。	1. 患严重疾病、发热者。2. 有过敏史者。3. 注射破伤风类毒素后发生神经系统反应者。	不良反应:注射本品后局部可有红肿、疼痛、发痒或有低热、疲倦、头痛等，一般不需处理即行消退。	武汉：188元/支 欧林：190元/支	22元/支

疫苗名称	预防疾病	免疫程序	接种方法、剂量	禁忌症	不良反应及注意事项	疫苗价格	预防接种服务费
23价肺炎球菌多糖疫苗	23种肺炎球菌血清型引起的系统性肺炎球菌感染	2岁以上高危人群	皮下或肌肉注射0.5ml	对疫苗中某种成分过敏者禁用，发热、急性感染、慢性病急性病急性发作期推迟接种。	不良反应：1、注射部位的局部反应：疼痛、红斑（暗红斑）、硬结、水肿，这些反应都吗 很轻微且为一过性。注意事项：1.皮内注射可能引起严重的局部反应。2.心血管和或肺功能严重受损的个体慎用本疫苗。3.若有发热性呼吸系统疾病或其它活动期感染，应推迟使用本品。	云南沃森：210元/支 默沙东：258元/支	22元/支
人用狂犬病疫苗	预防狂犬病	暴露后0（2剂）、7、21天各1剂，共4针或0、3、7、14、28天各1剂，共5针	上臂三角肌，幼儿可在大腿前外侧区肌肉注射0.5ml	1、暴露后治疗接种，无任何禁忌症。2、暴露前接种时：①严重过敏性疾病不接种。②发热、急性疾病、慢性病的活动期推迟接种。③对已知任何疫苗成份过敏者不接种。	不良反应：1、注射部位疼痛、红肿、瘙痒、硬结。2、轻度发热、寒战、晕厥、无力、头痛、胃肠道功能紊乱等。3、极少数人过敏反应、皮疹、荨麻疹。注意事项：1.以下情况者慎用：家族和个人有惊厥史者、患慢性疾病者、有癫痫史者、过敏体质者、哺乳期、妊娠期妇女。2.忌饮酒、浓茶等刺激性食物和剧烈运动。	宁波荣安：82元/支 成都康华：310元/支 长春卓远：82元/支 山东亦度：83元/支 北京民海：308元/支	22元/支
乙肝疫苗	乙型肝炎	全程免疫共3针，分别在0、1、6月	上臂外侧三角肌肌肉注射，10ug（酵母）0.5ml20ug（CHO、酵母）1ml	(1) 已知对该疫苗的任何成分，包括酵母、辅料过敏者。(2) 患急性疾病、严重慢性疾病、慢性疾病的急性发作期和发热者。(3) 妊娠期妇女。(4) 对未控制的癫痫和其他进行性神经系统疾病者。	不良反应：1.注射部位可能感到疼痛和触痛，多数情况下2-3天内自行消失。2.罕见一过性发热反应，接种部位轻、中度的红肿、疼痛、硬结，局部无菌性化脓，过敏反应，过敏性休克。注意事项：（1）患有家族和个人惊厥史者、慢性疾病者、有癫痫史者、过敏体质者慎用。（2）注射第1针后出现高热、惊厥等异常情况者，一般不再注射第2针。	华北20 ug预充：128元/支 康泰60ug预充：330元/支 艾美10ug预充：95元/支	22元/支
双价人乳头瘤病毒(HPV)疫苗	预防HPV16/18型引起的宫颈癌及其癌前病变	0、1和6月接种1剂次，共接种3剂，每剂0.5ML	上臂外侧三角肌肌肉注射	对本品中任一活性成分或辅料严重过敏反应者	不良反应：全身反应常见：疲乏，肌痛，头痛，发热(≥37℃)关节痛。局部反应常见：注射部位反应疼痛，发红，肿胀，以上大部分不良反应程度为轻至中度，且短期内可自行缓解。	339元/支	22元/支
流感病毒裂解疫苗	预防流行性感冒	6月龄以上的易感者及易发生相关并发症的人群	上臂外侧三角肌肌肉注射0.5ml	1、已知对该疫苗所含任何成分过敏者。2、患急性疾病、严重慢性疾病、慢性疾病的急性发作期。3、妊娠期妇女。4、未控制的癫痫、其他进行性神经系统疾病者，有格林巴利综合征病史者。	不良反应：1、一般接种后24小时内，注射部位可出现疼痛、触痛、红肿和瘙痒，多数情况下于2-3天内自行消失。2、接种疫苗后可能出现一过性发热反应，短期内自行消失，不需处理。注意事项：1、以下情况者慎用：家族和个人有惊厥史者、患慢性疾病者、有癫痫史者、过敏体质者。2、注射免疫球蛋白应至少间隔1个月以上接种本疫苗，以免影响免疫效果。3、注射后出现任何神经系统反应者，禁止再次使用。	四价流感：138元/支	22元/支

疫苗名称	预防疾病	免疫程序	接种方法、剂量	禁忌症	不良反应及注意事项	疫苗价格	预防接种服务费
重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）	适用于预防带状疱疹	本品适用于50岁及以上成人。	仅限肌肉注射，首选接种部位为上臂三角肌。	对本品的活性成份或任何辅料成份过敏者禁用	不良反应:全身不良反应包括头痛、发热等，局部不良反应 包括红斑、疼痛、肿胀等，以上不良反应程序度为轻至中度，且短期内可自行缓解。	葛兰素史克 1608 元 /支 百克生物 1379 元 / 支	22元/支